

指定医薬部外品



この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

#### △ 使用上の注意

##### 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の人には使用しないこと。

- 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 患部が広範囲の人。●深い傷やひどいやけどの人。

##### 【相談すること】

1.次の人には、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 医師の治療を受けている人。

- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

200包入

JANコード



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分及び分量】

100mL中  
<有効成分>日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5mL  
<基材>医療脱脂綿 20g

【効能又は効果】 手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法及び用量】 使用時本品を開いて脱脂綿を取り出し、手指又は皮膚を1日数回清拭する。

##### 【用法及び用量に関する注意】

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。●外用にのみ使用すること。

##### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 開封後はすみやかに使用すること。

お客様相談窓口 0120-50-0451

(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>