

【Alcohol Swabs】消毒用エタノール綿

第3類医薬品

# エレファコットンエコー

4cm×4cm 100枚入(110mL)

〈使用開始日時〉

月 日  
時



この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないこと。
- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。



**相談すること**

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

**その他の注意** 臨床検査値への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの診断を妨害することがある。

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒  
【用法及び用量】そのまま塗擦、清浄用として用いる。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 外用にのみ使用すること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。
- 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- アルコール分がたんばく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

【成分及び分量】

【有効成分】日局消毒用エタノール 100mL  
医療脱脂綿 17g

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。
- 開封後はすみやかに使用すること。
- 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451  
(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)  
ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>



【製造販売元】  
**ハクゾウメディカル株式会社**  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

【Alcohol Swabs】消毒用エタノール綿

第3類医薬品

# エレファコットンエコー

4cm×4cm 300枚入(330mL)

〈使用開始日時〉

月 日  
時



この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと。

- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。



**相談すること**

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

**その他の注意** 臨床検査値への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの診断を妨害することがある。

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒  
【用法及び用量】そのまま塗擦、清浄用として用いる。

〈用法及び用量に関連する注意〉

● 外用にのみ使用すること。● 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。● 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。● 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。● アルコール分がたんばく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

【成分及び分量】

【有効成分】日局消毒用エタノール 100mL  
医療脱脂綿 17g

【保管及び取扱い上の注意】

● 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。● 小児の手の届かない所に保管すること。● 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。● 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。● 開封後はすみやかに使用すること。● 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451  
(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)  
ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>



【製造販売元】  
**ハクゾウメディカル株式会社**  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

【Alcohol Swabs】消毒用エタノール綿

第3類医薬品

# エレファコットンエコー

8cm×8cm 50g入 (66枚 300mL)

〈使用開始日時〉

月 日  
時



この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

## ⚠ 使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと。

- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意 臨床検査値への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの診断を妨害することがある。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 外用にのみ使用すること。● 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。● 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。● 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。● アルコール分がたんばく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

【成分及び分量】

【有効成分】 日局消毒用エタノール 100mL  
医療脱脂綿 17g

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。● 小児の手の届かない所に保管すること。● 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。● 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。● 開封後はすみやかに使用すること。● 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒  
【用法及び用量】 そのまま塗擦、清浄用として用いる。



お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451

(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>



【製造販売元】

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

【Alcohol Swabs】消毒用エタノール綿

第3類医薬品

# エレファコットンエコー

8cm×8cm 26枚入 (110mL)

〈使用開始日時〉

月 日  
時



この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

## ⚠ 使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと。

- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意 臨床検査値への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの診断を妨害することがある。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 外用にのみ使用すること。● 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。● 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。● 同一部位に反復使用した場合は、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。● 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。● アルコール分がたんばく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

【成分及び分量】

《有効成分》 100mL 消毒用エタノール 100mL  
医療脱脂綿 17g

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。● 小児の手の届かない所に保管すること。● 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。● 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。● 開封後はすみやかに使用すること。● 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効果又は効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒  
【用法及び用量】 そのまま塗擦、清浄用として用いる。

お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451

(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>



【製造販売元】

ハクゾウメディカル株式会社  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号



4 958286 330716