

第3類医薬品 【Alcohol Swabs】
70%イソプロパノール綿
エレファコットシン
4cm×4cm 50枚入

〔使用開始日時〕

月 日 時

〔成分及び量〕

〔有効成分〕 イソプロパノール 70vol% 55mL
医療脱脂綿 9.3g

〔功能又は効果〕

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

〔用法及び用量〕

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

〔使用上の注意〕

フタ裏側の表示をよく読んでご使用ください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 958286 330518



〔製造販売元〕
ハクゾウメディカル株式会社
HAKUZO 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

△ 使用上の注意



してはいけない（守らないと現在の症状が悪化したり、ないことを）
副作用・事故が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないこと。

●損傷のある皮膚、●目の周囲、粘膜（目・口・鼻等）。

相談すること

1. 次の人には、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
●医師の治療を受けている人。

●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるで、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状 |
|------------|--|
| 皮 膚 | 発疹・発赤・かゆみ |
| その他のお問い合わせ | 医療検査値への影響 注射部位に発赤や起こることがあるので、アレルギーテストの診断を妨害することがある。 |

【成分及び分量】 100mL 中

【有効成分】 日局イソプロパノール 70mL
医療脱脂綿 17g

【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

002

【用法及び用量】 のままで塗擦、清浄用として用いる。

【用法及び用量】 に記載する注意

●外用のみ使用すること。●目に入らないように注意すること。万が一誤った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。

なお、症状が持続する場合は、眼科医の診察を受けること。●広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。

●同一部位に反復使用する場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがありますので注意すること。●小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

●アルコール分(たんぱく質)を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

●小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えること(瓶の原因になったら品質が変わる)。●衣類等につくと変色、変色することがあるので注意すること。●開封後はすみやかに使用すること。●火気にはつけないこと。

お客様相談窓口 ☎0120-50-0451

(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>

