



この容器は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の部位には使用しないこと。

- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜(目・口・鼻等)。



相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

350mL

第3類医薬品

販売名:エレファジェルS



80%エタノール

使用開始日 年 月 日

【成分及び分量】100mL中
 日本薬局方エタノール83mL
 添加物:ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、八アセチルしよ糖

【製造販売元】
 **ハクゾウメディカル株式会社**
 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号



エレファジェルS 80%エタノール 350mL

【効能又は効果】手指・皮膚の殺菌・消毒
 【用法及び用量】適量を消毒部位に塗布又は塗擦する。

〈用法及び用量に関連する注意〉●外用にのみ使用すること。●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。●広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。●同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【保管及び取り扱い上の注意】●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。●小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。●衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。●開封後はすみやかに使用すること。●火気に近づけないこと。

お客様相談窓口 ☎ 0120-50-0451 ポトル:PE
 (受付時間9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く) ポンプ:PP,M
 ホームページ <https://www.hakuzo.co.jp/> ラベル:PE



【火気厳禁】 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931 002
 危険物第4類、アルコール類(エタノール)、水溶性、危険等級II

JANコード



GS1-128



【使用方法】



＜使用する前＞
 キャップ①をもってノズル②を矢印の方向に回すとポンプが上がり、液が噴出します。数回押しと液が噴出します。

※ボトルは折りたたんで小さくして捨てることができます。

