

指定医薬部外品

ハクゾウ **G** **綿0.1** Chlorhexidine Gluconate Swabs
4cm×4cm 滅菌済 2枚入

この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと。

- 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 患部が広範囲の人。●深い傷やひどいやけどの人。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

200包入

JANコード



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【成分及び分量】100mL中
〈有効成分〉日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液 0.5mL
〈基 材〉医療脱脂綿 20g

【効能又は効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法及び用量】使用時本品を開いて脱脂綿を取り出し、手指又は皮膚を1日数回清拭する。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。
- 万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 開封後はすみやかに使用すること。

お客様相談窓口 ☎0120-50-0451

(受付時間 9:00～17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)

ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>