

# ウエットプレット®

この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)  
次の人は使用しないこと。  
●本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 患部が広範囲の人。●深い傷やひどいやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみじんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること。

### 成分及び分量

ウエットプレットの薬液は、100mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	日局ポビドンヨード10g (有効ヨウ素1g)
添加物	ラウロマクロゴール、pH調節剤2成分

### 効能又は効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。

### 用法及び用量

1日数回患部に塗布すること。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の洗浄・消毒には使用しないこと。


### 保管及び取り扱い上の注意

使用期限 2年(包装等に記載)

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 衣類等に付着すると着色するので注意すること。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。
- 開封後はすみやかに使用すること。

お客様相談窓口 ☎0120-50-0451  
(受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)  
ホームページ <http://www.hakuzo.co.jp/>

【原寸大】



【製造販売元】

**ハクゾウメディカル株式会社**  
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号