使用期限：2年
（容器等に記載）

外皮消毒剤
10%ポビドンヨード液　含浸綿球 **指定医薬部外品**

ウエットプレット®

Cotton balls Impregnated with 10% povidone-iodine

ご使用に際して、必ずお読みください。

区分	指定医薬部外品
承認番号	21500DZZ01525000
販売開始	2003年9月

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人には使用しないこと
- 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- 患部が広範囲の人
- 深い傷やひどいやけどの人

相談すること
次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
- 医師の治療を受けている人
- 本人又は家族がアレルギー体質の人
- 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

次の場合は、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

その他の注意
- 大量かつ長時間の接触によって接触皮膚炎、皮膚変色があらわれることがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- 石鹸類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石鹸分をよく洗い落としてから使用すること。
- 開封後ただちに使い切ること。

効能・効果 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

用法・用量 1日数回患部に塗布する。

〈用法及び用量に関する注意〉
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
  なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用すること。

成分及び分量

成分名／品名	本溶液 100mL中
日本薬局方　ポビドンヨード	10g
コットンボール（滅菌済）	8g

添加剤としてラウロマクロゴールを含有

保管及び取扱い上の注意
- 希釈を行わず、そのまま使用すること。
- 口径投与、目及び体内に使用しないこと。
- 衣類についた場合は水で洗い落とす。
  また、チオ硫酸ナトリウム溶液で脱色できる。
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わる。）
- 綿球等を継ぎ足して使用しないこと。

［製造販売元］
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
お客様相談窓口　0120-50-0451
（受付時間 9:00～17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く）
ホームページ http://www.hakuzo.co.jp/