第3類医薬品

エタノール消毒綿 エレファワイパーEI

Alcohol Swabs

この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の部位には使用しないこと。
- 損傷のある皮膚。
- 目の周囲、粘膜（目・口・鼻等）。

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意 臨床検査値への影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの診断を妨害することがある。

【成分及び分量】100mL中

《有効成分》エタノール	83mL
《添 加 物》イソプロパノール	3.7mL
《基 材》医療脱脂綿	20g

日局消毒用エタノールと同一濃度（76.9～81.4vol%）です。

【効能又は効果】手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法及び用量】そのまま塗擦、清浄用として用いる。

〈用法及び用量に関連する注意〉
- 外用にのみ使用すること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。
- 同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- アルコール分がたんぱく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器に用いる時は、十分に洗い流してから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】
- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。
- 開封後はすみやかに使用すること。
- 火気に近づけないこと。

001

4cm×8cm
2 折

200包入

JANコード

4 958286 709956

副作用被害救済制度 0120-149-931

お客様相談窓口 0120-50-0451
（受付時間 9:00～17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く）
ホームページ http://www.hakuzo.co.jp/

［製造販売元］
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号