エレファジェル 350mL

この容器は、製品とともに保管し、
ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）次の人は使用しないこと。

●患部が広範囲の人。●深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。●医師の治療を受けている人。●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

アルコール手指消毒剤

エレファジェル 350mL

指定医薬部外品

使用開始日
年　月　日

【成分及び分量】100mL中
日本薬局方エタノール83mL
添加物：ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、ハアセチルしょ糖

【製造販売元】
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

300
200
100

エレファジェル 350mL

【効能又は効果】手指・皮膚の洗浄・消毒
【用法及び用量】適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉●外用にのみ使用すること。●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。●広範囲又は長時間使用する場合は、蒸気の吸入に注意すること。●同一部位に反復使用した場合には、脱脂などによる皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【保管及び取り扱い上の注意】●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。●小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。●衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。●開封後はすみやかに使用すること。●火気に近づけないこと。

お客様相談窓口 0120-50-0451
（受付時間 9:00～17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く）
ホームページ https://www.hakuzo.co.jp/

プラ
ボトル：PE
ポンプ：PP、M
ラベル：PE

火気厳禁

危険物第4類、アルコール類（エタノール）、水溶性、危険等級Ⅱ

エレファジェル 350mL

【使用方法】 004



<使用する前に>
キャップ①をもってノズル②を矢印の方向に回すとポンプが上がります。数回押すと液がでます。

1.適量を手のひらにとります。

2.手指全体に伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。

※ボトルは折りたたんで小さくして捨てることができます。

JANコード
4 958286 036564

GS1－128
(01)04958286036564

印刷面（裏刷）	1	2	3
	特紺	ピンク	白

年　月　日		
校了	責了	面付け
		巾 1 丁

校正確認表

製版処理	色調整	検品	営業	校了	責了

○事故防止のためですので必ず確認して下さい。
○検印無き物は進行出来ません。

品名	61090018A エレファジェル用（部外品）	
1面寸法	流れ 68mm×幅 261mm	
巾送り数	1面	
印刷面	表刷(0)C／裏刷(3/3)C	
バーコード倍率	標準 80%	
出稿日	2020年03月27日	担当 松永
再稿日	2020年04月04日	担当 松永

2020.04 61090018A エレファジェル用（部外品）