この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）次の人は使用しないこと。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
   - 医師の治療を受けている人。
   - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
   - 患部が広範囲の人。
   - 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分及び分量

100mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	日局ポビドンヨード10g（有効ヨウ素1g）
添加物	ラウロマクロゴール、pH調整剤

効能又は効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

用法及び用量

1日数回患部に塗布すること。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
  なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の洗浄・消毒には使用しないこと。

保管及び取り扱い上の注意

使用期限：包材に記載

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと
  （誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 衣類等に付着すると着色するので注意すること。
  なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。
- 開封後はすみやかに使用すること。

お客様相談窓口　0120-50-0451
（受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く）
ホームページ http://www.hakuzo.co.jp/

001

紙

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

ハクゾウ ポビドンヨード綿棒

指定医薬部外品　外皮消毒剤

薬液量 2.0mL　No.12 1本入

使用方法

① 両側からアルミを切る。

② アルミの上から綿棒の軸を持ち、引き出す。



10%ポビドンヨード液含浸綿棒

ハクゾウ ポビドンヨード綿棒

指定医薬部外品　外皮消毒剤

薬液量 2.0mL　No.12 1本入

製品特長

綿棒と外皮消毒剤である10%ポビドンヨード液を含ませて包装した製品です。

消毒に適した薬液量

1回分が包装されており無駄がありません。

携帯に便利

個包装ですので携帯に適しております。

30袋入

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

ハクゾウ ポビドンヨード綿棒

指定医薬部外品　外皮消毒剤

薬液量 2.0mL　No.12 1本入

30袋入

10%ポビドンヨード液含浸綿棒

ハクゾウ ポビドンヨード綿棒

指定医薬部外品　外皮消毒剤

薬液量 2.0mL　No.12 1本入

Povidone-Iodine Cotton-tipped swab

[製造販売元]
ハクゾウメディカル株式会社
HAKUZO 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

30袋入