この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- ●医師の治療を受けている人。
- ●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ●患部が広範囲の人。
- ●深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分及び分量

プッシュ綿棒BZO.025%の薬液は、100mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	日本薬局方濃ベンザルコニウム塩化物液(50%)	0.05mL

効能又は効果

創傷面の殺菌・消毒

用法及び用量

1日数回患部に塗布する。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- ●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
  なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- ●本剤は外用にのみ使用すること。

保管及び取り扱い上の注意

使用期限 包装等に記載

- ●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- ●小児の手の届かない所に保管すること。
- ●他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- ●開封後はすみやかに使用すること。

副作用被害救済制度 0120-149-931

お客様相談窓口 0120-50-0451
(受付時間 9:00～17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く)
ホームページ https://www.hakuzo.co.jp/

[製造販売元]
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号