第3類医薬品 外皮用殺菌消毒剤

10%ポビドンヨード液 ＋ 綿棒 エタノール含有

プッシュ綿棒PF

PUSH SWAB PF

24袋入

10% povidone-iodine solution(contains ethanol) ＋ cotton-tipped swabs

この箱は、製品とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人は使用しないこと。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
   - 医師の治療を受けている人。
   - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
   - 患部が広範囲の人。
   - 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分及び分量

プッシュ綿棒PFの薬液は、100mL中に下記の成分を含有する。

有効成分	日局ポビドンヨード10g（有効ヨウ素1g）
添加物	**エタノール**、**グリセリン**、ラウロマクロゴール、pH調節剤3成分

効能又は効果

切り傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒。
とびひ、おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒

用法及び用量

1日数回患部に塗布すること。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
  なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 本剤は外用にのみ使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないこと。

保管及び取り扱い上の注意

使用期限　2年（包装等に記載）

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 衣類等に付着すると着色するので注意すること。なお付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。
- 開封後はすみやかに使用すること。
- 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度 0120-149-931

お客様相談窓口 0120-50-0451
（受付時間 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日を除く）
ホームページ http://www.hakuzo.co.jp/
［製造販売元］
ハクゾウメディカル株式会社
大阪市中央区徳井町2丁目4番9号